

乙酰辅酶 A 含量检测试剂盒说明书

Acetyl coenzyme A (Acetyl Co-A) Assay Kit

紫外分光光度法

货号: AK340

规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK340-A	50ml×1 瓶	4℃保存;
AK340-B	粉剂×1 支	4℃保存。临用前加入500μl AK340-E 充分溶解备用; 用不完的试剂 4℃保存 3 天;
AK340-C	20ul×1 支	4℃保存。临用前加入500μl AK340-E 充分溶解备用; 用不完的试剂4℃保存 3 天;
AK340-D	粉剂×1 支	-20℃保存。临用前加入45ml AK340-E 充分溶解备用; 用不完的试剂4℃保存 3 天;
AK340-E	50ml×1 瓶	4℃保存;
工作液的配制: 临用前请根据拟用工作液体积(样本数×0.92 ml), 将 AK340-B, C, D 按照 1:1:90 的比例混合, 或者直接把 AK340-B 和 AK340-C 加入到 AK340-D 中混匀(可以测定 48 样); 加样前置 37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)水浴锅中预热 30 min; 现配现用;		

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 乙酰辅酶 A (Acetyl-CoA) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 是生物体能源物质代谢过程中产生的一种重要的中间代谢产物。在体内能源物质代谢中是一个枢纽性的物质。糖、脂肪、蛋白质三大营养物质通过乙酰辅酶 A 汇聚成一条共同的代谢通路-三羧酸循环和氧化磷酸化, 经过这条通路彻底氧化生成二氧化碳和水, 释放能量用于 ATP 合成。此外, 乙酰辅酶 A 是合成脂肪酸, 酮体, 胆固醇及其衍生物等生理活性物质的前体物质。

原理: 苹果酸脱氢酶可催化苹果酸和 NAD 生成草酰乙酸和 NADH。柠檬酸合酶可催化乙酰辅酶 A 和草酰乙酸生成柠檬酸和辅酶 A。利用苹果酸脱氢酶和柠檬酸合酶的偶联反应, 乙酰辅酶 A 含量和 NADH 的生成速率成正比, 340nm 下吸光值的上升速率反应了乙酰辅酶 A 含量的高低。

自备用品:

紫外分光光度计、天平、低温离心机、恒温水浴锅、1 ml 石英比色皿、冰和蒸馏水。

乙酰辅酶A 的提取:

1. 细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量(10^4 个): AK340-A 体积(mL)为 500~1000: 1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL AK340-A), 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
2. 组织: 按照组织质量(g): AK340-A 体积(mL)为1: 5~10 的比例(建议称取约0.1g 组织, 加入1mL AK340-A), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min, 取上清, 置冰上待测。

测定步骤:

1. 分光光度计预热30min, 用蒸馏水于340nm 处调零。
2. 将工作液置37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)水浴锅中预热10 min。

3. 取 920μl 工作液和 100μl 样本至 1ml 石英比色皿，混匀，立即记录 340nm 处 20s 的吸光值 A1 和 80s 时的吸光值 A2，计算 $\Delta A = A2 - A1$ 。

乙酰辅酶 A 含量计算：

1. 按照样本质量计算

$$\text{乙酰辅酶 A 含量(nmol/g 鲜重)} = (\Delta A \div \epsilon \div d) \times V_{\text{反}} \times 10^9 \div V_{\text{样}} \times V_{\text{提}} \div W \times F = 1639.87 \times \Delta A \div W \times F$$

2. 按照细菌或细胞密度计算

$$\text{乙酰辅酶 A 含量(nmol/10}^4\text{)} = (\Delta A \div \epsilon \div d) \times V_{\text{反}} \times 10^9 \div V_{\text{样}} \times V_{\text{提}} \div 500 \times F = 3.28 \times \Delta A \times F$$

注：ε：NADH 摩尔消光系数， 6.22×10^3 L/mol/cm；d：比色皿光径，1cm； 10^9 ：单位换算系数，1mol= 10^9 nmol；V 反：反应总体积， 1.02×10^{-3} L；V 样：加入样本上清体积，0.1mL；V 提：加入提取液的体积，1mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌数量，500 万；F：稀释倍数。

。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴乳胶手套操作。
2. 蛋白含量测定可选用 Bioass 提供的 BCA Protein Assay Kit ([C05-02001](#)) 。