



焦磷酸：果糖-6-磷酸-1-磷酸转移酶活性检测试剂盒

PFP Assay Kit

紫外分光光度法

产品编号: AK510U

产品规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
ES510	50mL×1 瓶	4℃保存；
AK510-A	30mL×1 瓶	4℃避光保存；
AK510-B	粉剂×1 瓶	-20℃避光保存。临用前加 5mL 蒸馏水充分溶解；用不完的试剂分装后-20℃保存，禁止反复冻融。
AK510-C	粉剂×1 瓶	-20℃避光保存。临用前加 5mL 蒸馏水充分溶解；用不完的试剂分装后-20℃保存，禁止反复冻融。
AK510-D	0.5mL×1 瓶	4℃避光保存；
AK510-E	0.5mL×1 瓶	4℃避光保存；
AK510-F	5mL×1 瓶	4℃避光保存；

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 焦磷酸：果糖-6-磷酸-1-磷酸转移酶 (Pyrophosphate: fructose-6 – phosphate-1-phosphoric acid transferase, PFP; EC2.7.1.90) 是一种胞质酶，广泛存在于植物组织中，催化果糖-6-磷酸与果糖-1,6-二磷酸之间的可逆转化，在光合作用碳代谢中起重要作用。

原理: PFP 催化 6-磷酸果糖转化为 1,6-二磷酸果糖，它在醛缩酶和磷酸丙糖异构酶的作用下转变为 3-磷酸甘油醛，再由 3-磷酸甘油醛脱氢酶和 NADH 催化生成 3-磷酸甘油酸、NAD 和磷酸，340nm 处的吸光度变化反映了 PFP 的活性的高低。

自备用品:

紫外分光光度计、1ml 石英比色皿、天平、低温离心机、研钵、冰和蒸馏水。

酶液提取

- 组织: 按照质量 (g) : 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g, 加入 1mL ES510) 加入提取液, 冰浴匀浆后于 4℃, 10000g 离心 10min, 取上清置冰上待测。
- 细胞: 按照细胞数量 (10⁴ 个) : 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细胞加入 1mL ES510), 冰浴超声波破碎细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7 秒, 总时间 3min); 然后 4℃, 10000g 离心 10min, 取上清置冰上待测。
- 液体: 直接检测。

测定步骤:

- 紫外分光光度计预热 30min, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零。
- 取 1mL 石英比色皿, 依次加入:

试剂名称	测定管(ul)
AK510-A	580
AK510-B	100
AK510-C	100
AK510-D	10

AK510-E	10
AK510-F	100
粗酶液	100
充分混匀，记录 340nm 处 10s 的吸光值 A1 和 310s 的吸光值 A2, $\Delta A = A1 - A2$	

计算公式：

1. 按照样本蛋白浓度计算

酶活单位定义：每毫克组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PFP \text{ (U/mg prot)} = \Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 321.54 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

2. 按照样本质量计算

酶活单位定义：每克组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PFP \text{ (U/g 鲜重)} = \Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 321.54 \times \Delta A \div W$$

3. 按照细胞数量计算

酶活单位定义：每 10^4 个细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PFP \text{ (U/}10^4 \text{ cell)} = \Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{细胞数量} \div V_{\text{样总}}) \div T = 321.54 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

4. 按照液体体积计算

酶活单位定义：每毫升液体每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$PFP \text{ (U/mL)} = \Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T = 321.54 \times \Delta A$$

注：V 反总：反应体系总体积，1mL； ε ：NADH 摩尔消光系数， $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ；d：比色皿光径，1cm；

V 样：加入样本体积，0.1mL；V 样总：加入提取液体积，1mL；T：反应时间，5 min；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g。