



淀粉分支酶活性检测试剂盒

SBE Assay Kit

可见分光光度法

产品编号: AK420V

产品规格: 50T/24S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
ES420	25mL×1 瓶	4℃保存;
AK420-A	20mL×1 瓶	4℃保存;
AK420-B	粉剂×2 支	4℃保存; 临用前每支加入1mL蒸馏水, 95℃沸水浴充分溶解后备用; 剩余试剂4℃保存, 四周之内有效;
AK420-C	25mL×1 瓶	4℃保存;
AK420-D	5mL×1 瓶	4℃保存;

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 淀粉分支酶 (Starch branching enzyme, SBE) (EC 2.4.1.18) 主要存在于植物中, 是参与支链淀粉合成的关键酶, 测定SBE活性在淀粉生物合成、优质农作物品种选育和品质遗传改良研究中具有重要意义。

原理: 直链淀粉和碘结合后在 660nm 有特征光吸收, SBE 使直链淀粉含量减少, 从而降低了淀粉-碘复合物在 660nm 吸收值, 一定时间内吸光度下降的百分率可以反映 SBE 活性。

自备用品:

可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1 mL 玻璃比色皿、研钵、冰、蒸馏水。

粗酶液提取:

按照组织质量 (g) : ES420 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL ES420), 进行冰浴匀浆。15000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

测定步骤:

1. 分光光度计预热 30 min 以上, 调节波长到 660nm, 蒸馏水调零。
2. 样本测定 (在 EP 管中加入下列试剂) :

试剂名称	对照管 (μL)	测定管 (μL)
95℃水浴 1min 后灭活的粗酶液	250	
粗酶液		250
AK420-A	320	320
AK420-B	30	30
混匀, 37℃准确保温 20 min, 95℃水浴 5min (盖紧防止水分散失), 冷却		
AK420-C	500	500
AK420-D	40	40
混匀, 室温静置 10min, 用蒸馏水调零, 660nm 处读取各管吸光值。		
注: 每个测定管需设一个对照管。		

注意:

- (1) 可以在不同对照管中加入不同样品的粗酶液, 然后集中进行 5min 95℃沸水浴处理。
- (2) AK420-B 如有沉淀, 务必沸水浴溶解后使用。

SBE 活力单位的计算：

1. 按照蛋白浓度计算

单位定义：以波长 660nm 的吸光度下降百分率表示，每 mg 蛋白在反应体系中每降低 1% 碘蓝值为一个酶活性单位。

SBE 活性 (U/mg prot) = (A 对照管-A 测定管)/A 对照管×100

2. 按照样本鲜重计算

单位定义：以波长 660nm 的吸光度下降百分率表示，每 g 组织在反应体系中每降低 1% 碘蓝值为一个酶活性单位。

SBE 活性 (U/g 鲜重) = (A 对照管-A 测定管)/A 对照管÷(W÷V 样总)×100

注：V 样总：提取液总体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样品质量，g。

※ 蛋白定量检测建议使用本公司：BCA Protein Assay Kit ([C05-02001](#))